



**DIABETESZENTRUM ERFURT**  
Internistische Gemeinschaftspraxis

Thälmannstrasse 25, 99085 Erfurt

Tel.: 0361 5667216

Fax: 0361 5667211

[www.diabeteszentrum-erfurt.de](http://www.diabeteszentrum-erfurt.de)

[info@diabeteszentrum-erfurt.de](mailto:info@diabeteszentrum-erfurt.de)

**Dr. med. Sven Becker**

FA f. Innere Medizin/Diabetologie/HIV-  
Schwerpunktbehandlung/Notfall- und Suchtmedizin

**Dr. med. Stefanie Fleißner-Richter**

FÄ f. Innere Medizin/Diabetologie/Ernährungsmedizinerin

**Dr. med. Vera Sophia Dajani**

FÄ f. Allgemeinmedizin/Diabetologie/Notfallmedizin

**Dr. med. Theresa-Maria Mittenzwey**

FÄ f. Allgemeinmedizin und Palliativmedizin

**Dr. med. Freya Ritter**

FÄ f. Innere Medizin



## Informationen für Reisen in Malaria- Hochrisikogebiete

### Atovaquon + Proguanil Chemoprophylaxe der Malaria

**Handelsnamen**(rezeptpflichtiges Medikament)

- MALARONE®: Atovaquon 250 mg/Tbl. + Proguanil 100 mg/Tbl.
- MALARONE® Junior: Atovaquon 62,5 mg/Tbl. + Proguanil 25 mg/Tbl.

#### **Indikation**

Die fixe Kombination Atovaquon/Proguanil (Malarone®) kann zur Prophylaxe und Therapie einschließlich der notfallmäßigen Selbstbehandlung von unkomplizierten Infektionen durch *P. falciparum* und zur Akutbehandlung anderer Malariaformen eingesetzt werden. Dieses Medikament ist besonders geeignet für Last minute-Reisen oder Kurzaufenthalte (< 5 Tage) in Malariagebieten.

#### **Anwendung und Dosierung**

**Dauer:** : ab 1. Tag des Urlaubs, während der Reise, Ende: 7 Tage nach der Reise.

**Modus:** 1x/Tag. Einnahme nach dem Abendessen (bessere Verfügbarkeit).

**Dosis:**

	MALARONE® Tbl./Tag	MALARONE® Junior Tbl./Tag
Erwachsene > 40 kg	1	nein
Kinder		
05-08 kg*		½
09-10 kg*		¾
11-20 kg	nein	1
21-30 kg		2
31-40 kg		3

**Kontraindikationen**

Bekannte Überempfindlichkeit auf eine der Komponenten, schwere Lebererkrankungen, Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min).

**Schwangerschaft**

Nicht erlaubt. Es liegen keine Untersuchungen vor.

**Unerwünschte Wirkungen**

Bauch- und Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Anorexie, Durchfall, Husten. Nebenwirkungen meist mild und vorübergehend.

**Alternative**

Doxycyclin (in Dtl. dafür nicht zugelassen!)

LARIAM®

Gerne beraten wir Sie ausführlich in unserer reisemedizinischen Sprechstunde.

Das Praxisteam!